

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ**

• Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχόμενο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος στον αγρό και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του σκευάσματος στο θερμοκήπιο. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μπότες, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρα για το στάρι και κριθάρι
- 15 μέτρων για το βαμβάκι
- 20 μέτρων για μηδική, γογγύλια, σελινόριζα, πατάτα, τομάτα, λαχανάκια βρυξελλών, κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, κινέζικα λάχανα
- 25 μέτρα για την ελαιοκράμβη
- 30 μέτρα για το αμπέλι

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελιού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην το εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία εάν το προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί.

Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναπνεύστε καθαρό αέρα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα που έχει έλθει σε επαφή, με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά, με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή, (όχι περισσότερο από μια μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουσ ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας**

# CYPERGAN 100EW

**Cypermethrin (Συπερμεθρίν) 10%**

**ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW)**

Εγγυημένη Σύνθεση: Cypermethrin: 10% β/α  
βοηθητικές ουσίες: 91,55% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14.597/09.02.2017

## Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na<sup>+</sup> στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς σε μακροχρόνιες επιπτώσεις  
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση  
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**UFI: 53E7-6RFS-VK0X-25EW**

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής: **SBM DEVELOPEMENT**  
160, route de la Valentine, B.P. 90120 - 13371 Marseille cedex 11, France



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**PHYTOrgan**  
ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ**  
**1 ΛΙΤΡΟ**

**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ**

- **Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):** Για Ευμείδα, Κογχυλίδα, Τζιτζικακία, Ταγαρολόγο, Πορτολίδα. Δόση: 30-60 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30ml/στρέμ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΤΟΜΑΤΑ υπαίθρου και θερμοκήπιου:** Για Πράσνο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριαμία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαϊέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή Καραφατίε, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδη, Δορυφόρο, Diabrotica spp., Τζιτζικακία. Δόση: 30-60 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΠΑΤΑΤΑ:** Για Αφίδες, Δορυφόρο, Φθοριαμία. Δόση: 30-75 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρέμ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ:** Για Αλτη, Δορυφόρο, Αλευρώδη, Αφίδες, Τζιτζικακία, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριαμία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαϊέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή Καραφατίε. Δόση: 30-75 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρέμ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Για Προνύμφες Λεπιδοπτερών, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Διπρόση, Αγρότιδα, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδη, Θρίπες. Δόση: 30-60 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρέμ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
- **ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ:** Για Αφίδες, Αγρότιδα. Δόση: 85-125 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρέμ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Για Αφίδες. Δόση: 85-125 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (25 ml/στρέμ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΜΗΔΙΚΗ:** Για Προνύμφες Λεπιδοπτερών, Φυτόνομο, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Διπρόση, Αγρότιδα, Σποντόπτερα, Αφίδες. Δόση: 25-75 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 40-120 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ):** Για Αλευρώδη, Αφίδες. Δόση: 100-150 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** Για Αλευρώδη, Αφίδες. Δόση: 20-30 ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 ml/στρ. max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
- **Παρατηρήσεις:** Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C. Το ψεκάστικο υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκάστικο μέσο. **Τελευταία επίμβαση πριν τη συγκομιδή:** ΓΡΑΣΙΔΙ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Μη εφαρμοσίμο. • ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: 3. ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ: 7. ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ, ΜΗΔΙΚΗ: 14. ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ: 21. ΕΛΑΙΟ ΚΡΑΜΒΗ: 28.
- **Τρόπος εφαρμογής:** Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλωμάτων εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκάστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Καθαρισμός ψεκάστρου:** Τριπλό ξεπλυσμα. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία**