



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο, Στόχος, Δόσεις και Χρόνος Εφαρμογής): **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Γκρέϊπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά, Φράπα): Κόκκινη ψώρα, Άσπρη ψώρα, Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Κίτρινος τετράνυχος, Ακάρεα (*Eutetranychus banksi*, *Panonychus citri*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών με 1000-3000 κ.εκ./στρ. σε 100-200 λτ. ψεκ. υγρού/στρ. (1000-1500 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά, Αχλαδόμηλα): Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα*, Ψευδόκοκκος*, Ψώρες* (*Eriococcus lagerstroemiae*), Ματόφειρα*: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα, Κίτρινος τετράνυχος*: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ***: Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα ή Διάσπες, Λεκάνιο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Κηροπλάστης, Ψώρες (*Sphaerolecanium prunastri*, *Eulecanium persicae*), Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Παραμορφωτικό ακάρι, Ακάρεα (*Aculus pelekassi*, *Bryobia rubrioculus*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ***: Βαμβακάδα, Κίτρινος Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Ακάρεα (*Bryobia praetiosa*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού/στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΦΙΣΤΙΚΙΑ***: Κίτρινος Τετράνυχος, Λεκάνιο, Ψώρες (*Parthenolecanium gruinouso*, *Parthenolecanium corni*, *Coccus hesperidum*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΕΛΙΑ***: Παρλατόρια, Λεκάνιο, Πολλίνια, Άσπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Ψώρες (*Leucaspis riccae*, *Chrysomphalus dictyospermi*), Ακάρεα (*Eriophyes vitis*, *Tegolophus hassani*, *Oxycesus maxwelli*, *Eotetranychus carpinii*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού/στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΑΜΠΕΛΙ***: Ερίνωση, Κίτρινος Τετράνυχος: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού/στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΡΟΔΙΑ***: Τετράνυχος, Ακάρεα (*Eriophyes grannati*): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΣΥΚΙΑ***: Κίτρινος Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Κηροπλάστης, Ψευδόκοκκος: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ***: Κίτρινος Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα ή Διάσπες: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με 375-1500 κ.εκ./στρ. σε 50-150 λτ. ψεκ. υγρού /στρ. (750-1000 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Κατά τη χρήση του PLANT OLEO τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. 3. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 5. Να μη γίνεται εφαρμογή του PLANT OLEO επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιέργειες καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

PLANT OLEO

Paraffin oil 79% (παραφινέλαιο)

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14667/25.06.2018

Εγγυημένη Σύνθεση: Paraffin oil (CAS 8042-47-5) 79% β/ο (94,05% β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 6% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και δειξίδυσης στις αναπνευστικές οδούς

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και 10 μέτρων σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα. • Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

UFI: HV60-D0GT-G001-RQPT

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής:

LAINCO S.A. Pol. Ind. Can Jordi, Avda. Bizet, 8-12, 08191 Rubi, Barcelona, Ισπανία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

PHYTORGAN

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 ΛΙΤΡΟ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την ορισμένη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα με δ.ο. θειάφι, θειασβεστίο, captan, folpet.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάμενες χρήσεις, δόσεις και προφύλαξεις.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως και σε θερμοκρασία >0°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ. Παρασκευής (Prod. date): βλέπε συσκευασία (see packaging)
Αρ. Παρτίδας (Batch No):

