

RHIZOPON AA 1%

Indolylbutyric acid 1%
AP (Ετοιμόχρηστη σκόνη, άλλες μορφές σκόνης που εφαρμόζονται χωρίς διάλυση)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8.268 / 24.02.2017

Εγγυημένη σύνθεση: Indolylbutyric acid 1% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το ινδολοβουτυρικό οξύ χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τον σχηματισμό ριζικού συστήματος σε μοσχεύματα καλλωπιστικών φυτών. Το ινδολοβουτυρικό οξύ είναι μια φυτοφρομόνη της οικογένειας των αυξηνών. Οι αυξινές είναι απαραίτητες για την αυξηση των κυττάρων, επηρεαζόντας τόσο την διαίρεση όσο και την επιμήκυνση των κυττάρων. Η αύξηση και η διαίρεση των φυτικών κυττάρων οδηγούν στην ανάπτυξη των φυτικών ιστών.

RHIZOPON®

Κάτοχος της άδειας:
Rhizopon BV, Rijndijk 263a,
2394 CE Hazerswoude-Rd,
The Netherlands

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά :



ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ
ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • FAX: 210 62 51 869

Τρόπος εφαρμογής: Εμβάππιση μοσχευμάτων μέσα στην ετοιμόχρηστη σκόνη.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος γρ/ στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Καλλωπιστικά φυτά	Διέγερση ανάπτυξης ριζικού συστήματος (ριζοβολίας) μοσχευμάτων	4-10 κιλά / στρέμμα Μέγιστη δόση: 25mg σκευάσματος ανά μόσχευμα	Εμβάππιση των μοσχευμάτων μέσα στην ετοιμόχρηστη σκόνη. ^{1,2}	1

GR1216

09.03.17

GR1221

86221

Αριθμός προϊόντος:

Ημέριο προφωνής:

Αριθμός παρίστασης:

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρωπινή υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε πις οδηγίες χρήσης. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Επαφή με τα μάτια:

Καλέστε έναν γιατρό. Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε με σταθερή, ήπια ροή του νερού για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Κατάποση:

Καλέστε ένα γιατρό ή ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε πποτά από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Πιείτε αμέσως μια μεγάλη ποσότητα του γάλακτος, ασπράδι αυγού, διάλυμα ζελατίνης, ή, αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού. Αποφύγετε το αλκοόλ.

Επαφή με το δέρμα:

Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Εισπνοή:

Μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέετε, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Αγ. η αναπνοή είναι δύσκολη, δωστε οξυγόνο. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. - Ακολουθήστε συμππωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Παρατηρήσεις:

- Το Rhizopon AA 1% είναι προϊόν έτοιμο για χρήση.
- Τοποθετήστε τη βάση του μοσχευμάτος σε βάθος 1-2 εκ. (ανάλογα από το μέγεθος του μοσχεύματος) μέσα στην σκόνη. Βυθίστε τις βάσεις όλων των μοσχευμάτων με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη ριζοβολία των μοσχευμάτων. Απομακρύνετε την περίσσεια της σκόνης από το μόσχευμα, τινάσσοντάς το. Το μόσχευμα θα αρχίσει να σχηματίζει ρίζες σε ολόκληρη την καλυμμένη με σκεύασμα επιφάνεια του.
- Κάτα την εφαρμογή, πρέπει να προσέξετε ώστε η σκόνη να μην έρθει σε επαφή με τα φύλλα ή άλλα μέρη του φυτού, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φυτό.
- Διατηρήστε την σκόνη στεγνή. Η υγρή σκόνη χάνει γρήγορα την δραστικότητά της. Αδειάστε επαρκή ποσότητα σκόνης από την αρχική της συσκευασία για αμεση χρήση. Η ποσότητα της σκόνης που δεν χρησιμοποιήθηκε δεν πρέπει να επιστρέψεται στην αρχική συσκευασία, για την αποφυγή πιθανής μολυνσης.
- Συνιστάται για προετοιμάσετε το έδαφος πριν την φυτευση, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια σκόνης κατά την φυτευση. Μετά τη φυτευση, πέστε το έδαφος γύρω από το μόσχευμα ή/και πτοίστε.
- Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται σε κλειστό/εσωτερικό. Μετά την εφαρμογή, τα μοσχεύματα μεταφέρονται στο θερμοκήπιο. Μεταφορά των μοσχευμάτων σε υπαίθριες συνθήκες δεν θα γίνει μέχρις ότου αυτά να αποκτήσουν ρίζες, το οποίο στην πράξη γίνεται 2-3 μήνες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος στα μοσχεύματα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Δεν είναι φυτοτοξικό στα μοσχεύματα στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε θερμόκρασια δωματίου και σε σκοτεινό μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρυπήμα για τη διάσφαλισή της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.