



# BACK 100SC

## Cyazofamid 10%


### Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Cyazofamid 10% θ/σ  
βοηθητικές ουσίες: 90,16% θ/θ  
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61044/16.07.2021

## Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση

Το σκέυασμα BACK 100 SC, είναι ένα μυκητοκτόνο με προληπτική δράση, για την αντιμετώπιση του περονόσπορου, σε αμπέλι, τομάτα και πατάτα. Η δραστική ανήκει στους παραμποδιότες Q<sub>i</sub> και διακόπτει την μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας των μιτοχονδρίων των ωομυκήτων.

### ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής: **MANICA SpA** Via all' Adige, 4, T.K. 38068 ROVERETO (Trento) - Ιταλία. Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ΦΑΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ** Δαβακί 65, T.K.: 17672 Καλλιθέα - Αθήνα, e-mail: gregory@agripplus.gr



Συσκευαστής - Διανομέας:  
**PHYTORGAN**  
ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 - 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΤΗΛ. 210 62 52 600 - www.phytorgan.gr

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ**  
**400 κ.εκ.**



ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ / ΡΙΘΟ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερίων από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στην καλλιέργεια υπαίθρου να αφηστέτε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων ή μία ασφάλκη ζώνη 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% στην καλλιέργεια του αμπελιού και
- Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στη καλλιέργεια τομάτας υπαίθρου.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

- Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση και να το φέρετε σε καθαρό αέρα, όπου μπορεί να αναπνεύσει καλά αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

- Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγήστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον ασθενή εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

#### ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

- **Αμπέλι** (επιτραπέζιες, οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Περονόσπορο. Δόση: 90-110 ml σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργη. περίοδο: 6 ανά 7 ημέρες.
- **Μήγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητική περίοδο:** 4 ανά 8 ημέρες με τη χαμηλότερη δόση ή 4 ανά 12 ημέρες με τη μεγαλύτερη δόση.
- **Τομάτα** υπαίθρου και θερμοκηπίου: Για Περονόσπορο. Δόση: 80 ml σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: α) Για τομάτα θερμο-

κηπίου 40-100 λίτρα/ στρέμμα. β) Για τομάτα υπαίθρου 40-60 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργη. περίοδο: 6 ανά 5 ημέρες.

• **ΠΑΤΑΤΑ:** Για Περονόσπορο. Δόση: 80 ml σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος και μέχρι πριν τη συγκομιδή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητική περίοδο: 6 ανά 5 ημέρες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Προληπτικό ψεκασμού φυλλώματος μέχρις απορροής.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδευόντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στην συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριήμερη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, επαποτίθενται σε σημεία συλλογής ή ανακύκλωσης ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Το σκέυασμα

περιέχει τη δραστική cyazofamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 21 κατά FRAC. Συστάται: - Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας και - Η εφαρμογή του σκευάσματος πριν την εμφάνιση της αδιαθεσίας. Καθρίστε το πρόγραμμα ψεκασμών με βάση τις μεταβολολογικές προβλέψεις και τον βαθμό της προσβολής.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυασμα:** Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

**Τελευταία επίμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταυλκεπτικές χρήσεις:** Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφυλιά) 21 ημέρες. • Τομάτα (Υ), Τομάτα (Θ): 3 ημέρες. • Πατάτα: 7 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

