

210.00 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. - Αποφύγετε να αναπνέετε εκκενώματα. - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα ατομικής προστασίας για τα μάτια ή προστατευτικό φακό. - Φοράτε προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή της ελαιοεπιβρέθισης προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την εφαρμογή σε τσίχλες θερμοκρασία.

Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το οικίσκω ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λυόμενες επιφανείες και τους φράγμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφαιρέτε μια αδιάκοπη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα. - ΕΣΠΕΡΛΩΔΙΩΣ: 20 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 75%. - ΜΗΛΟΕΙΔΗ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ / ΑΚΡΟΦΥΤΑ: 25 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 75%. - ΕΛΙΑ: 12 μέτρα εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φωτική ζώνη ανάσχεσης. Για να προστατέψετε τα έσομα επικονίασης, στην τομάτα (Θ), πιπεριά (Θ), αγγούρι (Θ) και μελιτζάνα (Θ), καλύψτε τις κηφές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά. Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση. Αερσιάζτε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανείσοδο. Περιεχέι 2-ethylhexyl-3-lactate. Για να αποφευχθεί το κινδύνω για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΧΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕΣΜ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέτε εμετό. - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΧΗ ΕΠΙΛΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΧΗ ΕΠΙΛΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιλύστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους. Εφαρμόστε ένα επίθεμα. Εάν υπάρχουν ειδικά αντίδοτα. Ακολουθήστε συμπληρωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210 7937377**

Το ρηγιστικό έχει επίδραση: α) σε ώλε ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκολοπή περιποίηση ή επιβουνοτά και ποσοποιούνται μεταβρωσικές αλλαγές, β) ανατέλλει την μεταβρωσική των προσαρτήων, γ) προκαλεί παραμόρφωση της έκδοσης των νυμφών και της σφαιρότητας των αυσίων και δ) έχει στεφανωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη νοσηλία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ων. Η αποτελεσματικότητα του κενδοφροντος στα εντόμα-στόχους εμφανίζεται τα ανα και σταδιακά, συγκορμίζοντας με εντεταμένο ποό όρους στο νεοεικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστήιο σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους. Η μετακίνηση της δραστήιας ουσίας ρηγιστικού στα φυτά είναι δολοθητική. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να ελθόν το νεοεικό σε επαφή με το οικίσκω και να γίνει κατόπι.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης στα πρώτα προαναρκύτα στάδια των εφρών, κατά προτίμηση εναντίον προαναρκύτων πρώτου σταδίου.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αναμείξτε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδίνοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναδίνοντας τον ανάδρα.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Προσθέτουμε το βύτιο και όλα τα εφόρτηματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται από πλεί με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται πλύση ζεσμού (α νερό του ζεσμούματος) το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) από ανάσχεση αφού καταστράφουν προηγούμενα με τριπλά, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να ανατεθούν όλα σε οικιακά απορρίμματα ή ανάσχεση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις αναμειγμένες χρήσεις σε ίδιες τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Ειδικές οδηγίες για κηφές, φυτοκίτες ή περιβιβαλλογικούς, υπό τις οποίες το οικίσκω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποδοκιμαθεί.** Διαχειριθεί αναεκτικότητας, για να αποφευχθεί η εφαρμογή αναεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται το οικίσκω, ούτε κάποιο άλλο οικίσκω που περιέχει ρηγιστικό, περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή κατά του αλευρώδη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το οικίσκω. Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Ζυγιές αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του οικίσκωματος. Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλίση/αναστροφή σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αερισμένο. Τις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από τη ημερομηνία παρασκευής παρασκευής.
ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡ. ΠΑΤΗΤΙΑΣ: Βλέπε συσκευασία

TOREX 10EC

Pyriproxyfen 10%

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

Εγνημένη Σύσταση: Pyriproxyfen 10% θ/σ
Βοηθητικές ουσίες: 88,97% θ/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εντομοκτόνο - ρημιτιστής ανάπτυξης μιμητικό της ορμονικής νεότητας των εντόμων

Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμείο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενδηκίωσή τους

ΦΥΛΑΣΣΑΤΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στην σε αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.

Παρασκευαστής οικίσκωματος: LAINCO S.A. (μέλος της TASK FORCE - PDDA), Pol. Ind. Can Jardí, Avda. Bizet, 8-12, 08191 Rubí, Barcelona, Ισπανία.

Κάτοχος της αδειας - Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

PHYTORGAN

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟ 6 - 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 - www.phytorgan.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
500 Κ.ΕΚ.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΗΣ-ΜΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

- Επεξευδισμός (Πρώτο φρούτο, Λεμόνια, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Αμπιά, Για Κοκοειδή, Κίτωση φρούτα, Αποβλαστήσεις, Λεμόνια, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Παπαδικά, Δόση: 112,5 κ.εκ./στρ. ή 50-75 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων σταδίων της 1ης γενιάς. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

- Ακρόφωτα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντούκια, Καροφάκι, Καρπούζι) (χρήσιες ήσσονος σημασίας). Για Κοκοειδή, Ψύρα του Σαν Ζακέ. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. ή 40-50 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαμεγείζουσες μορφές. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (πριν την ανθήση).

- Μελιτζάνα (Μελιτζάνα, Αγκινιά). Χρήσιμες ήσσονος σημασίας. Κοκκοειδή, Αμυγδαλιά, Μουσαμμάλα. Για Κοκοειδή, Ψύρα του Σαν Ζακέ. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. ή 40-50 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος της διαμεγείζουσας μορφής. Για Ρημοειδιστικές ρητινώδεις. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. ή 30 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (πριν την ανθήση).

- Αμπιά (χρήσιμη ήσσονος σημασίας). Για Κοκοειδή, Ψύρα του Σαν Ζακέ. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. ή 40-50 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαμεγείζουσες μορφές. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (πριν την ανθήση).

- Πυριπροξυφέν (Βερμολή, Βοσκάνη, Διαμοκίνηση, Κερσάδα, Βουσσάνη). Για Κοκοειδή, Ψύρα του Σαν Ζακέ. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. ή 40-50 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 70-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων σταδίων.

- Πυριπροξυφέν (Βερμολή, Βοσκάνη, Διαμοκίνηση, Κερσάδα, Βουσσάνη). Για Κοκοειδή, Ψύρα του Σαν Ζακέ. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. ή 40-50 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (πριν την ανθήση).

- Ελιά (Ελιά Ακκινώ). Δόση: 37,5 κ.εκ./στρ. ή 30 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 100-125 λίτρα/στρ. Πριν τη ανθήση και εφύσον εμφάνιση σε προαναρκύτη 1ης γενιάς(1). Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

- Τομάτα (Θ). Για Αλευρώδη. Δόση: 80 κ.εκ./στρ. ή 50-75 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων (1). Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2, από 10 ημερών.

- Πιπεριά (Θ). Για Αλευρώδη. Δόση: 75 κ.εκ./στρ. ή 50-75 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων (1). Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 από 10 ημερών.

- Βαμβάκι (Θ). Για Αλευρώδη. Δόση: 80 κ.εκ./στρ. ή 50-75 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Όγκος φέκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων (1). Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 από 10 ημερών.

- Βαμβάκι (Θ). Για Αλευρώδη. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. ή 40-80 λίτρα/στρ. Πριν το άνοιγμα των καρπών και με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

- Πεύκα (Θ) σπόκων και περισποκίων περηνών. Για *Marchalina hellena*. Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα φέκ. υγρού. Κάθε 15 ημερών.

Όταν έχει εκκαθαριθεί το 70-75% των νυμφών (επιουσία) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μολυνθεί εκτεταμένα και δεν παρατηρείται δραστηριότητα των μελιούων (1). Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. (με την προϋπόθεση ότι η ίδια περίοδος δεν χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.α.).

Παρατηρήσεις: 1. Σε πρώτες υφρών πληθύνσεων ορισμών αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο οικίσκωμα ώστε να μειωθεί ο πληθύνος και να αποτιμω η εφαρμογή το TOREX 10 EC. 2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί αποτελεσματικότητα στα δέντρα για ενδοκρινή εντομοκτόνα (χρήσιμα σποκων) στις καλλιεργείες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντούκια, Καρπούζι, Καρπούζι, Κοκκοειδή, Αμυγδαλιά, Μουσαμμάλα, Αμπιά, Βερσάκια, Ροδάκινά, Διαμοκίνηση, Κερσάδα, Βουσσάνη (Θ) από τη χρήση του οικίσκωματος. Για τις εν λόγω χρήσεις η δόση δεν φέρει ενοχή για πιθανές επιπτώσεις που αφορούν την παραγωγή ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του οικίσκωματος. 3. Στην ίδια χρονιά δεύτερο οικίσκωμα δόση κατά τη *Pantodon oleae*. 4. Μεσοδιάστημα μεταξύ των 10 ημερών στην ερμωκροσία είναι μεγαλύτερο των 25 °C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη. 5. Για τη χρήση σε πικνά πεύκα να εφαρμόζονται οι αναδωδές οδηγίες ασφαλείας, περιουσία: 1-2 ακρόφωτα ανά κ.εκ. στην ερμωκροσία. 6. Αποφύγετε την εφαρμογή του οικίσκωματος στα πεύκα που ανθοποιούν ή είναι κατόπι και κοινοποιούν ή της νεοεικόμης αυτοδωκίτης ή άλλης κατόπις υπαρκτός. 1-3 φορές εφαρμογής ψεκασμός με καλή διάχυση, των προαναρκύτων από *Marchalina hellena* με την εμφάνιση των πρώτων προαναρκύτων σταδίων των κηφών ων είναι εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του οικίσκωματος (όσο σε κοινοποιήστες όσο και σε ιδιαιτητικές χώρες) και σε όλα στεγνωμένα τα ψεκαστικά μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται ανθρώπινα παιδιά και κατοικίδια ζώα στην περιοχή δραστηριότητας. Σε κοινοποιήστες χώρες (πάρκα, πλατείες) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων. Η χρήση του οικίσκωματος, για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchalina hellena* πρέπει να ακολουθείται με προσοχή και να κατασκευάζονται με προσοχή: 1. Σε κοινοποιήστες χώρες με ενοχή των κηφών πρώτης γενιάς και κοινοποιούν, οι οποίοι θα καθορίσουν τη ασφαλή ημερομηνία εφαρμογής του οικίσκωματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, να αναρτηθούν σε τους στεγνωμένα των δέντρων μια επιβουνοτά την εφαρμογή του οικίσκωματος στους κοινοποιήστες χώρες της περηνής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Τελευταία επίλυση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά στον πρόκετο για μεταλλοκεκλιές χρήσεις. (Πρώτο φρούτο, Λεμόνια, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Αμπιά, 30 ημέρες, Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), 3 ημέρες, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντούκια, Καρπούζι, Καρπούζι, Κοκκοειδή, Αμυγδαλιά, Μουσαμμάλα, Αμπιά, Βερσάκια, Ροδάκινά, Διαμοκίνηση, Κερσάδα, Ελιά, Βαμβάκι, Πεύκα: Καλλιεργείται από τον χρόνο εφαρμογής.

100.00 mm

11/2021