

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

(Καλλιέργειες - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών)

- Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού. Για μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 100 κ.εκ./στρ. ή 100-250 κ.εκ./100 λίτρα υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 400-100 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 15 ημέρες.

- Ρύζι. Για βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπόδεσης. Για βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 λίτρα/στρ. Ένας ψεκασμός στην αρχή της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

- Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια). Για αύξηση γονιμότητας γύρως, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσμου, βελτίωση μεγέθους και ποιότητας καρπών, πρωμάτητα. Δόση: 50-75 κ.εκ./στρ. ή 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός 10 μέρες πριν την άνθηση, 2ος στην αρχή της άνθησης και επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 10 ημέρες.

- Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου. Για μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 100 κ.εκ./στρ. ή 50-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-200 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 15 ημέρες.

- Πιπεριά Θερμοκηπίου. Για μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 100 κ.εκ./στρ. ή 50-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-200 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5 ανά 15 ημέρες.

- Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου. Για μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 100 κ.εκ./στρ. ή 50-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 10 ημέρες.

- Ελιά (επιτραπέζια-ειδαιμονισμός). Για βελτίωση της άνθησης και της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 100 κ.εκ./στρ. ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. 1ος ψεκασμός στο στάδιο των μπου μπουκιών, 2ος ψεκασμός 10 μέρες αργότερα, 3ος ψεκασμός στην άνθηση και 4ος ψεκασμός στην καρπόδεση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργεία. περίοδο: 4 ανά 10 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Η δόση/HL θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψ.στρ. ώστε να μην έχεπεται η μέγιστη δόση/στρ. 2. Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού 3 ημέρες, Ρύζι 90 ημέρες. Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) 14 ημέρες. Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου 3 ημέρες. Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου 3 ημέρες. Πιπεριά Θερμοκηπίου 3 ημέρες. Ελιά 60 ημέρες.

ASAHI SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

Φυτορρυθμιστική ουσία

Διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής τής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών. Οδηγεί σε πρωίμιση και βελτίωση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8227/23.07.2014

Εγγυημένη Σύνθεση: Sodium 5-nitroguaiacolate 0,1% β/ο, Sodium o-nitrophenolate 0,2% β/ο, Sodium p-nitrophenolate 0,3% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 99,4% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή κοπίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της έγκρισης: Asahi Chemical Europe s.r.o. Lužná 716/2 160 00 Praha 6 - Vokovice, Τσεχία



Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

PHYTOORGAN

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 ΛΙΤΡΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέστε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φιλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκεύασμάτος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευτη μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξπλησμό γίνεται τριπλό έξπλησμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια φύγου καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περατέωρα χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία ουλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό δάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσθιασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Οι εργάτες θα πρέπει να φορέσουν προστατευτικά γάντια εάν εισέρθουν στον αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαση συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ. Παρασκευής (Prod. date): βλέπε συσκευασία (see packaging)

Αρ. Παρτίδας (Batch No):