

CLEANCLASTER

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

Σύνθεση: Φωσφονικό Μαγνήσιο 36,6gr (=478,18gr/lit)
Βοηθητικές ουσίες έως 100gr

Πυκνό διάλυμα (SL)

Το CLEANCLASTER είναι ένα επιφανειοδραστικό νέας γενιάς που εξασφαλίζει την ταχύτερη απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και την πιο αποτελεσματική ακροπεταλική και βασιπεταλική μετακίνηση του ζιζανιοκτόνου, ενισχύοντας έτσι τον τρόπο δράσης του. Το προϊόν ενισχύει τη δράση των διασυστηματικών και μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων ή ακόμα και σε λιγότερο ευαίσθητα ζιζάνια. Η προσθήκη του CLEANCLASTER επιτρέπει την επίτευξη ταχύτερης δράσης των ζιζανιοκτόνων ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες.

01/2022


Παρασκευαστής σκευάσματος: EURO T.S.A. S.r.l.
via G. Marconi 13 - 24040 Fornovo San Giovanni
(BG), Τηλ: 0363/337452



Διανομέας

PHYTORGAN

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr



Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν



ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ

3
ΛΙΤΡΑ

CLEANCLASTER

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το CLEANCLASTER μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διασυστηματικά και μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Μειώνει έως και 50% τη δόση εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων.
- Η συνιστώμενη δοσολογία του CLEANCLASTER είναι 100-150ml/στρ. Για τα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν Glyphosate, συνιστάται η χρήση του CLEANCLASTER με δοσολογία 150ml/στρ.
- Η μέγιστη δόση των 150 ml/στρ. δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί.
- Να μην εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς.
- Να εφαρμόζεται απουσία ανέμου.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης και με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Εφαρμόζεται ο χρόνος εφαρμογής, η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και οι προφυλάξεις του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα ετικέτα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που προκαλούνται ως συνέπεια της μερικής ή ολικής μη τήρησης της οδηγίας της ετικέτας. Η συμμόρφωση με όλες τις ενδείξεις που περιέχονται σε αυτή την ετικέτα είναι ουσιαστικής προϋπόθεσης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του σκευάσματος και για την πρόληψη βλαβών στα φυτά, στους ανθρώπους και στα ζώα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-

ηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε συσκευασία

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην ρουπίνετε το νερό με το προϊόν και τη συσκευασία του • Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, με τα μάτια, εισπνοής ή κατάποσης, καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, τα μάτια, εισπνοής ή κατάποσης: **Άμεσα συμπτώματα:** ερεθισμός της μύτης και του λαιμού, βήχας, δύσπνοια, πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και βλάβη στα μάτια. Πόνος στο στόμα και στο στομάχι. Εμφάνιση συμπτωμάτων δηλητηρίασης. **Καθυστερημένα συμπτώματα:** πνευμονικό οίδημα, βρογχίτιδα, χημική πνευμονία. Ερεθισμός και φουσκάλεις. Πιθανή ή αναστρέψιμη βλάβη στα μάτια. Πεπτική αιμορραγία, διάτρηση του οισοφάγου και του στομάχου, μεταβολική οξέωση και κίνδυνος πεπτικής στένωσης.