

# MEXY·CO

## 25 WP

Αριθμός Άδειας Διάθεσης  
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
61038 / 25.05.2021

### Metalaxyl (Μεταλαξύλ) 25%

#### ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

**Εγγυημένη σύνθεση:**  
Metalaxyl 25% β/β  
Βοηθητ. ουσίες 73,7% β/β

## Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Το metalaxyl είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό σπορίων παρεμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει την προστασία της νεαρής βλάστησης.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ • ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για πορτοκαλιά, γκρέιπφρουτ, αμπέλι, πατάτα, τομάτα (Υ), μελιτζάνα (Υ), μαρούλι (Υ), σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντιδία (Υ).

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ:** Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση δυσφορίας. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητο άτομο. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

UFI: 9XG6-6APH-QA01-UTMW



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**PHYTORGAN**

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr



Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής:

**INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.**  
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles,  
Barcelona, Ισπανία



**ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ**

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

### (Καλλιέργειες - Ασθένεια - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)

► **Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ.** • Για Φυτόφθορα: 40-80 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: - Ψεκασμός από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: **3** με μεσοδιάστημα **14** ημέρες. - Στάγδην άρδευση από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας, με δόση 150 γρ. / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **1**.

► **Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)\*** • Για Περονόσπορο: 80-200 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **2** με μεσοδιάστημα **21** ημέρες.

► **Φράουλα (Θ).** • Για Φυτόφθορα: 150 γρ./στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Στάγδην άρδευση από την έκπτυξη του 3ου φύλλου μέχρι την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού (λίγο μετά την πτώση των πετάλων). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **1**.

► **Πατάτα.** • Για Περονόσπορο: 80-200 γρ. σκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης της 1ης ταξιανθίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **3** με μεσοδιάστημα **10** ημέρες.

► **Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ).** • Για Περονόσπορο: 80-200 γρ. σκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **3** με μεσοδιάστημα **10** ημέρες.

► **Πιπεριά (Θ).** • Για Περονόσπορο: 150 γρ./στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Στάγδην άρδευση από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το άνοιγμα των ανθέων σε 9 ή περισσότερες ταξιανθίες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **2** με μεσοδιάστημα **14** ημέρες.

► **Μαρούλι (Υ), Σκαρόλες (πικριδα) / πλατύφυλλα αντίδια (Υ).** • Για Περονόσπορο: 80-200 γρ. σκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **3** με μεσοδιάστημα **10** ημέρες.

\*Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

#### Παρατηρήσεις:

1. Να ρυθμίσετε τη δόση ανά εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
2. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά όταν το επίπεδο της προσβολής είναι χαμηλό.
3. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μπορεί να μειωθεί εάν βρέξει μέσα σε 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

#### Τρόπος εφαρμογής:

- α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
- β) Στάγδην άρδευση.

#### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το ήμισυ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

#### Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με σχίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

#### Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία metalaxyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά FRAC. Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των μυκήτων.
- Συνιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των καλλιεργειών για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης του σκευάσματος.

#### Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

- 14 ημέρες στο αμπέλι.
- Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

#### Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ, Αμπέλι, Φράουλα (Θ), Πατάτα, Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ), Μαρούλι (Υ), Σκαρόλες (πικριδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ): **14** ημέρες.

#### Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία**