AXORIN 25 SC

Azoxystrobin 25% - Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,4% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61079 / 17.05.2022

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο

με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών

Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**
- **Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.**
- **Περιέχει 1,2-bensizothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. *Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμιξη και φόρτωση. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και γάντια.*

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να μην εφαρμόζεται σε αργιλώδη, μη αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες των κραμβοειδών, φυλλωδών, βολβωδών λαχανικών, της αγκινάρας, των αρωματικών φυτών, της πατάτας, του φασολιού, της φακής, του μπιζελιού και της φράουλας.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης: -10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των σιτηρών, του αραβοσίτου, του φασολιού, της φακής και του μπιζελιού, **-20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των κραμβοειδών, φυλλωδών, ριζωματωδών, κολοκυνθοειδών, σολανωδών, βολβωδών λαχανικών, της αγκινάρας, του σπαραγγιού, των αρωματικών φυτών, της φράουλας, των καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων και του καπνού. ***Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.***

08/2022

Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική Τ.Κ. 15349

UFI: EMPT-1ATS-H00S-50EP

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

PHYTORGAN
ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μπουτωμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: –

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: - Μην ψεκάζετε όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή ξηρό. -Προσοχή κατά την εφαρμογή όταν η διπλανή καλλιέργεια είναι μηλιά, δαμασκηνιά, κερασιά. -Στην καλλιέργεια του ρυζιού να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 30%. -Στην καλλιέργεια της πατάτας να εφαρμόζεται μία φορά ανά 2 χρόνια.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: -Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες. -Εφαρμόστε το σκεύασμα σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπιλουρινών (Qoi) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα. - Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις. - Το ΑΧΟRIN 25 SC είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το ΑΧΟRIN 25 SC, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. - Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το ΑΧΟRIN 25 SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αγκινάρα, Μαρούλι: Κατααρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια (Υ), Κρεμμύδια (χλωρά), Αντίδι (Υ), Ρόκα (Υ), Αρωματικά φυτά (Υ), Λυκοτριβόλο (Υ), Φύλλα σέλινου, Φύλλα άνηθου (Υ/θ), Σπανάκι (Υ/θ): **7 ημέρες**. Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Σκόρδο, Κρεμμύδια (ξηρά), Φασόλια (με και χωρίς λοβό), Μπιζέλια (με και χωρίς λοβό), Καρότο, Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξέλλων, Κάλε (λαχανίδα), Κνέζικο Λάχανο, Ρέβα, Παπανάκι, Σελινόριζα, Σέλερι, Φινόκιο (Μαραθόριζα), Μαρούλι: Κατααρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια (θ), Μαϊντανός, Αντίδι (θ), Αρωματικά φυτά (θ), Λυκοτριβόλο (θ), Ρόκα (θ), Καπνός: **14 ημέρες**. Κολοκυθάκια (Υ/θ), Κολοκύθα (Υ/θ), Αγγουρι (Υ/θ), Πεπόνι (Υ/θ), Καρπούζι (Υ/θ), Πιπεριές (Υ/θ), Τομάτα (θ), Μελιτζάνα (θ), Φραουλές (Υ/θ), Μπάμια (Υ/θ): **3 ημέρες**. Πράσο: **21 ημέρες**. Μπιζέλια (ξηρά), Φασόλια (ξηρά), Φακές, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: **35 ημέρες**. Ρύζι: **28 ημέρες**. Σπαραγγι, Αραβοσιτος, Πατάτα, Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι: —.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ)

- **Αγκινάρα.** Για Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **50-125** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής). Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Σπαράγγι.** Για Σκωρίαση, Σπερμόιλιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **30-100** λίτ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος Όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξής των καρπών. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Μελιτζάνα (θερμοκηπίου).** Για Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. (**80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για Αλτερνάρια, Περονόσπορο. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. (**80-100** κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λτ/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Πιπεριές (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** Για Ωίδιο, Αλτερνάρια. Δόση: **80** κ.εκ./ στρ. (**80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες**.
- **Τομάτα (θερμοκηπίου).** - Για Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. (**80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). - Για Αλτερνάρια, Περονόσπορο. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. (**80-100** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **40-100** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Μπρόκολο, Κουνουπίδι.** Για Περονόσπορο, Αλτερνάρια. Δόση: **80-100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως όπου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **12 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Για Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορο. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. (**80-100** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για Ωίδιο. Δόση: **80** κ. εκ./στρ (**60-80** κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως τη πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Κολοκυθάκια (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) • Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** - Για Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορο. Δόση: **100** κ.εκ./ στρ. (**80-100** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). - Για Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. (**60-80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως τη πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** Για Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορο, Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. (**80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **50-120** λίτ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως τη πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Κολοκύθα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** Για Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορο, Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. (**80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λίτ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως τη πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Σκόρδο.** - Για Σκωρίαση, Περονόσπορο και • **Κρεμμύδια ξηρά**. - Για Περονόσπορο. Δόση: **80** κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-50** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιάσει. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Φασόλια (με και χωρίς λοβό).** Για Σκωρίαση, Ασκοχύτωση. Δόση: **80-100** κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **15-80** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7ου πραγματικού φύλλου έως την έναρξη σχηματισμού λοβών. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Μπιζέλια ξηρά.** Για Σκωρίαση, Ασκοχύτωση. Δόση: **80-100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-50** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου/έλικα έως όπου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Ρύζι.** Για Πυρικουλάρια, Ελμινθοσπόρια. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-40** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της άνθησης. Η 1η εφαρμογή γίνεται από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της έκπτυξης της ταξιανθίας, και η 2η εφαρμογή, εάν κρίνεται απαραίτητη, από το στάδιο όπου το 70% της ταξιανθίας έχει εμφανισθεί έως και την έναρξη της άνθησης. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Φράουλες (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** Για Ωίδιο. Δόση: **80** κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **50-80** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Σιτάρι • Βρώμη • Σίκαλη • Κριθάρι.** Για Σππορίωση, Σκωρίαση. Δόση: **60-100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-30** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης [για το Σιτάρι και τη Σίκαλη] ή έως την πλήρη έκπτυξη του στάχυος [για τη Βρώμη και το Κριθάρι]. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Πράσο.** Για Περονόσπορο. Δόση: **80** κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-100** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιάσει. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **12 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Καρότο** Για Ωίδιο, Αλτερνάρια, Σππορίωση. Δόση: **80-100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως τη πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Σελινόριζα.** Για Αλτερνάρια, Σππορίωση. Δόση: **100** κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως όπου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Σέλερι • Φινόκιο (Μαραθόριζα).** Για Αλτερνάρια, Σππορίωση. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως όπου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Ραπανάκι.** Για Αλτερνάρια, Σππορίωση. Δόση: **80-100** κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως όπου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. Μέχρι **3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **10 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Μαϊντανός.** Για Αλτερνάρια, Σππορίωση. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως όπου το φύλλωμα φθάσει στο τυπικό του μέγεθος και μορφή. Μέχρι **2-3 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Φασόλια (ξηρά)** • **Φακές.** Για Σκωρίαση, Ασκοχύτωση. Δόση: **80-100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-50** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7ου πραγματικού φύλλου έως όπου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Μπιζέλια, αρακάς με χωρίς λοβό.** Για Σκωρίαση, Ασκοχύτωση. Δόση: **80-100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-50** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως το τέλος της άνθησης. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **14 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Μαρούλι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)[1], Λυκοτρίβολο • Αντίδι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) • Ρόκα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** Για Περονόσπορο. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **30-120** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως όπου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή [για το μαρούλι (Υ+θ), το λυκοτρίβολο και τη ρόκα (Υ+θ)] ή έως όπου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή και κλείσει [για το αντίδι (Υ+θ)]. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Αραβόσιτος (για ενσίρωση και για παραγωγή σπόρων).** Για *Setosphaeria turcica*. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-30** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της άνθησης και 21 ημέρες μετά. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **21 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Αρωματικά φυτά (βασιλικός, κόλιανδρος, ρίγανη, θυμάρι, μέντα, δυόσμος, σχοινόπρασο, μυρώνι) (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου).** Για Περονόσπορο, Αλτερνάρια. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **20-60** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως όπου το προς συγκομιδή μέρος φθάσει στο τυπικό του μέγεθος. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες** εφόσον απαιτείται.
- **Πατάτα (γραμμική εφαρμογή)** Για Ριζοκτόνια. Δόση: **300** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **5-15** λίτρα/στρ. Ενσωμάτωση στο έδαφος πριν τη φύτευση ή κατά τη μεταφύτευση. **1 εφαρμογή.**
- **Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι* (χρήση ηφσοινος σημασίας).** Για *Oidium sp.* Δόση: **100** κ.εκ./στρ. (**80-100** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **40-100** λίτρα/στρ. Ψεκασμός από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο. **3 εφαρμογές.**
- **Καπνός* (χρήση ηφσοινος σημασίας).** Για Περονόσπορο, Ωίδιο. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **30-90** λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικούς ψεκασμούς κατά την περίοδο της ανάπτυξης φυλλώματος έως την άνθηση. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες.**
- **Φύλλα σέλινου* (Υ/θ), Φύλλα άνηθου* (Υ/θ), Σπανάκι* (Υ/θ) (χρήση ηφσοινος σημασίας).** Για Περονόσπορο. Δόση: **100** κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού **30-120** λίτρα/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως όπου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες.**
- **Μπάμια* (Υ/θ) (χρήση ηφσοινος σημασίας).** Για Ωίδιο, Αλτερνάρια. Δόση: **80** κ.εκ./στρ. (**80** κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού **50-100** λίτ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα **7 ημέρες.**

Πρατηρήσεις: 1. Η χρήση στην καλλιέργεια του μαρουλιού αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις σύμφωνα με την ΥΑ 7807/207777/05.08.2021: Κατααρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια των καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων, του καπνού, των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου, του σπανακιού και της μπάμιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απώλειες που εφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ημ. Παρασκευής (Prod. date) / Αρ. Παρτίδας (Batch No):
βλέπε συσκευασία (see packaging)