ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή την ετικέτα. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Κατάποση:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Εισπνοή:** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. **Επαφή με το δέρμα:** Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν. **Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

UFI: 94DF-WQ34-1D15-0895

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/ διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: —

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα κουτιά με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενοποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: —

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για τις χρήσεις στα ανθοκομικά φυτά σε περίπτωση ποικιλιών ελάχιστα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισηγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφανείες των καλλιεργειών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): • Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Αγκινάρα, Αμπέλι επιτραπέζιο, Καπνός: **14.** • Αμπέλι οινοποιήσιμο: **21.** • Φράουλες, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σμέουρα, Βατόμουρα: **3**. • Μπάμια (Α): **7.**

Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά δέντρα, Καλλωπιστικοί θάμνοι: **Δεν ορίζεται.**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία penconazole η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. • Στο αμπέλι, τα μηλοειδή και τα καλλωπιστικά δέντρα η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μικητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο, στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φράουλα, αγκινάρα, πιπεριά, μπάμια, τομάτα, μελιτζάνα ανθοκομικά και καλλωπιστικούς θάμνους) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. • Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μικητοκτόνα DMI το 50% των συνολικών επεμβάσεων. • Σε περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μικητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μείγματα μικητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

07/2022

PENOZOL 100EC

Penconazole 10%

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Penconazole 10% (β/ο)
βοηθητικές ουσίες: 89,36% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61077/13.05.2022

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο

με προστατευτική και θεραπευτική δράση

για την καταπολέμηση του ωιδίου σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**
- **Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.**
- **Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • **Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.** • **Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.** • **Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.** • **Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.** • **Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.** Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβακερό μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια. **Να μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη ασφαλείας **5** μέτρων σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων. *Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

Κάτοχος της άδειας: **Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**
Λ. Ανθούσας, 153 49 Ανθούσα Αττική

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
PHYTORGAN
ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
400 κ.εκ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
(**Α:** αγρού, **Θ:** θερμοκηπίου, **Λτ:** λίτρα)

- **Μήλα, Αχλάδια, Κυδώνια:** Για Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*): 25-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./ στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-140 λτ/στρ. Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm έως το στάδιο καρπών με διάμετρο 80% του τελικού μεγέθους; ***δόση σκευάσματος 0,25 λτ/HA LWA. 3 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Ροδακινιά, Βερικοκιά:** Για Ωίδιο (*Podosphaera tridactyla, Podosphaera pannosa, Sphaerotheca pannosa*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λτ/στρ. Από το στάδιο του σχησίματος της στεφάνης έως το στάδιο ωρίμανσης των καρπών. 2 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Αμπέλι:** Για Ωίδιο (*Erysiphe necator*): 30 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λτ/στρ. Από την εμφάνιση ταξιανθίας έως το κλείσιμο του τσαμπιού. 3 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Αγκινάρα:** Για Ωίδιο (*Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum*): 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λτ/στρ. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του ανθικού στελέχους έως το κιτρίνισμα του πάνω μέρους του 10-20% των ανθοκεφαλών (μετά το στάδιο της συγκομιδής για νωπή κατανάλωση). 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Φράουλα (Α-θ):** Για Ωίδιο (*Podosphaera aphanis*): 50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λτ/στρ. Έναρξη ανάπτυξης στολώνων (φρατέι, περίπου 2cm) έως τη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί. 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα (Α-θ):** Για Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λτ/στρ. Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών. 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Κολοκυθάκι (Α-θ):** Για Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λτ/στρ. Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων στο κύριο βλαστό έως ότου 9 ή περισσότερα καρποί στον κύριο βλαστό να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα. 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Πιπεριά (Α-θ):** Για Ωίδιο (*Leveillula taurica*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λτ/στρ. Από την εμφάνιση του 5ου κλειστού ανθέως έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Μελιτζάνα (Α-θ):** Για Ωίδιο (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λτ/στρ. Από την εμφάνιση του1ου κλειστού άνθους έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Τομάτα (Α-θ):** Για Ωίδιο (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-140 λτ/στρ. Από το στάδιο καρπών διαμέτρου 10mm έως το στάδιο καρπών με διάμετρο 80% του τελικού μεγέθους; ***δόση σκευάσματος 0,25 λτ/HA LWA. 3 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Σμέουρα, Βατόμουρα:** Για Ωίδιο (*Podosphaera aphanis*): 40 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λτ/στρ. Έως το στάδιο ωρίμανσης των καρπών. 1 εφαρμογή.
- **Καπνός:** Για Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*): 50 κ.εκ./ στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λτ/στρ. Από την ανάπτυξη των πλάγιων βλαστών ως την συγκομιδή. 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Ανθοκομικά (Α-θ): Τριανταφυλλιά** για *Sphaerotheca pannosa, Phragmidium sp*, **Μπιγκόνια** για *Erysiphe sp*, **Ντάλια** για *Sphaerotheca sp*, **Καλεντούλα** για *Oidium sp*, *Puccinia sp*, **Χρυσάνθεμο** για *Puccinia horiziana*, **Πελαργόνιο** για *Puccinia pelargonii-zonalis*, **Γαρυφαλιά** για *Puccinia sp*., **Ποτεντίλα** για *Puccinia sp*., **Αγγελική** για *Oidium evonimy japon*, **Japanese spindle tree** για *Oidium sp*, **Αλθέα** για *Puccinia sp.*: 30-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λτ/ στρ. Με την έκπτυξη του 3ου πραγματικού φύλλου/σπείρας/ ζεύγους φύλλων έως την ωρίμανση των σπόρων/καρπών. 2 εφαρμογές με 7-12 ημέρες μεσοδιάστημα.
- **Καλλωπιστικά δέντρα*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Ωίδιο (*Oidium sp*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λτ/στρ. Φεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο. 3 εφαρμογές.
- **Καλλωπιστικοί θάμνοι*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Ωίδιο (*Oidium sp*): 30-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λτ/στρ. Φεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο. 2 εφαρμογές.
- **Μπάμια (Α)*** (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Ωίδιο (*Leveillula taurica*): 35-50 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λτ/στρ. Από όταν είναι εμφανείς οι ανθόφυροι οφθαλμοί μέχρι 9 ή περισσότερα καρποί να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος. 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις: ***HA LWA: 10.000m² έκταση επιφάνειας κώμης. Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα).

Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN). Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μπάμιας και των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που οφφρούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».