

# BARRIS 2.5EC

Deltamethrin 2,5%

## Υγρό γαλακτωματοποίηση (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14836/03.07.2023

### Εγγυημένη Σύνθεση:

deltamethrin 2,5% β/β  
βοηθητικές ουσίες: 97,19% β/β

## Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων

Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαλύσεις των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΠΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ)

- Επεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μαυραντίνα, Λεμονιά, Γκρίπερτοφ, Νεραντζιά),** Για Αφίδες, Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λι. φεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρ.), Για Λεμόνια, Μόγα της Μεσογείου, Δόση: 50 κ.εκ./100λ φεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.), Όγκος φεκ. υγρού 100 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.
- Αρωματικά φυτά (Μαιντανός, Φύλλα αέλιου, Ρόκα),** Για Αφίδες, Σπυνοπτερά, Μυρμεκία, Αλτήρ, Δόση: 50 κ.εκ./100 λι. φεκ. υγρού (35 κ.εκ./στρ.), Για Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 70 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.
- Ψευδαβή (Σπαρτιά), Φασόλια, Κουκιά, Οακή, Ρεβίθια,** Για Πρόσπο σκουλήκι, Αφίδες, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 50-100 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.
- Μπιζέλια φρέσκα (αρακάς),** Για Αφίδια των μπιζελιών, Σπίττα, Δόση: 25 κ.εκ./στρ. Για Αφίδια των κουνιών, Καμψία των μπιζελιών, Θρίπες, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.
- Αγκινάρα,** Για Κοσπίδα, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Για Πρόσποτα, Αφίδες, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.
- Πατάτα,** Για Δορυμύκηρα, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Για Σπυνοπτερά, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 60 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.
- Καννάς,** Για Θρίπα, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 50-100 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.
- Βαμβάκι** (Πρόσπο), Ρεβίθιο σκουλήκι, Κοσπίδα σκουλήκι, Δόση: 50-70 κ.εκ./στρ. Για Αλετριώδη, Τζιζινάκιο, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Για Σπυνοπτερά, Αφίδες, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 30-50 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.
- Ζαχαρωτόμα, Παντζάρια,** Για Αφίδες, Πόδι των τευλαίων, Αλτήρ, Σπυνοπτερά, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Για Κοσπίδα, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 50 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. 1 εφαρμογή.
- Αράβιστος\*\*\*,** Για Πυραλίδα, Σελάμια, Πρόσπο σκουλήκι, Σπυνοπτερά, Αφίδες, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Για Διαβρωτήρα, Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 60 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημερες. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερες.
- Σίτηρα - Σίττα, Κρήθαρι, Βρώμη, Σίκαλη,** Για Αφίδες, Κορτοσκούληκα, Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 40-60 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. 1 εφαρμογή.
- Μήλιση,** Για Αφίδια των μπιζελιών, Σκαθίρι των μπιζελιών, Φυτονόμο, Δόση: 25 κ.εκ./στρ. Όγκος φεκ. υγρού 40 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.
- Καλλιμασιές (Υαίθρου, Φυτωνα και Βερμοκίττου),** Για Αφίδες, Θρίπες, Δόση: 50 κ.εκ./100 λι. φεκ. υγρού (17,5-35 κ.εκ./στρ.), Για Φυλλόκετες, Δόση: 35 κ.εκ./100 λι. φεκ. υγρού (12,5-50 κ.εκ./στρ.), Όγκος φεκ. υγρού 50-100 λι/στρ. Για Αλετριώδη, Δόση: 70 κ.εκ./100 λι. φεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.), Όγκος φεκ. υγρού 70 λι/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. Ψεκ 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η Πυρεθρινοειδής δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρων φυεκοκτομικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο φυεκοκτομικού υγρού (100 λίτρα/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. \*\* Δεν επιτρέπεται η συσκευη ή απελευθέρωσή της στο οποίο έγινε χρήση του αυτοπροστατευτικού προϊόντος. \*\*\* Η εφαρμογή του προϊόντος στον αρόσφατο όδηση στή μείωση των επιπέδων των μυκητοκτόνων, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. - Αποφεύγετε να αναπνεύσετε ατμούς / αναθυμώσεις/ αέρια/ σταγονίδια / ατμούς/ εκνεφώματα. - Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. «Οι εργαζόμενοι να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το φυεκοκτομικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.» «Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.»

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκακτη ζώνη προστασίας από τα επαναενακά νερά: **5 μέτρων** για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδροβόλες και τα αμπέλια ή καθόλου αφέκακτη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυίων μειωμένης διασποράς **90%**. **15 μέτρων** για τις δενδροβόλες καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυίων μειωμένης διασποράς **90%**. Δεν απαιτείται αφέκακτη ζώνη προστασίας από τα επαναενακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυίων μειωμένης διασποράς **90%**.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκακτη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 εκ. (ή καθόλου αφέκακτη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυίων μειωμένης διασποράς 90%) από την μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αφέκακτη ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δενδροβόλες καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυίων μειωμένης διασποράς **90%**. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμούν στις κυψέλες για μια μερ εξωαφελίζονται τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδυνά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας (ζιζανίων). Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που ο μέλισσας αλλογούν.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Συνεχίστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ. Πληροφορίες για το γιατρό/θεραπευτικό μέτρο: Επιστόμο χειρισμός:** Συμπωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, ενστάλαξη τοπικά αναλγητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντίδοτο. **Αντιμετώπιση πλάσμων:** Χορηγήστε διαζεράμ: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβια. Χορηγήστε όσο χρειάζεται ώστε να προησιεί απώλυση του παθόν. Για παιδιά 2,5mg ενδοφλέβια. **Αντενδείξεις:** ατροφική και παράγνοια αδrenalινά. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμίο εύφλεκτα. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και δεισδύσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπηλμία ή ζάλη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • «Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

Κάτοχος της άδειας: GOWAN Crop Protection Limited, Rothamsted Research, West Compton, Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ, Αγγλία.

UFFI: AKR2-XOU9-700A-J4XK

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **PHYTORGAN** ΠΕΡΙΘΩΙΟΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ. 210 62 52 600 • [www.phytorgan.gr](http://www.phytorgan.gr)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ **1 ΛΙΤΡΟ**

07/2023